

DRACHT EN GEBORTE BIJ DE POES

Dekking

Indien een dekking goed is verlopen is de krolsheid ca. 24 uur na de dekking totaal over. Tijdens de drachtigheid mag de poes geen krolsheid meer vertonen want dit is een teken dat de dekking niet goed verlopen is. Een goed verlopen dekking geeft natuurlijk geen garantie op drachtigheid. Een **dracht duur ongeveer 58-65 dagen**. Hoe groter het nest hoe korter de dracht over het algemeen duurt.

De drachtige poes

De laatste 2 weken van de dracht doet u er goed aan om de poes wat meer (25%-50% extra t.o.v. de gewone portie) **voeding** te geven. Speciaal voedsel is niet nodig, gewoon kattenvoer is voldoende. **De dracht is vast te stellen** vanaf de 28-32e dag na de dekking met een **echo**. Na 42 dagen dracht kan door middel van een **röntgenfoto dracht en het aantal kittens** worden aangetoond. Na 4 weken dracht gaat het gewicht van de poes flink toenemen. Naar het einde van de dracht toe mag haar gewicht met 40% zijn toegenomen.

Verschuiven van de naderende bevalling

Ruim voor de bevalling zal waarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat de buikomvang van uw poes ruim is toegenomen. De melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan soms ook gebeuren bij niet drachtige poezen, rond hetzelfde tijdstip. We spreken dan van schijnvrucht. Vlak voor de bevalling wordt de poes wat onrustig en kan het opvallen dat de poes soms een helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen 24 uur zullen plaatsvinden.

De bevalling

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen moet het eerste kitten geboren zijn. Het vruchtwater kan groen van kleur zijn, in dat geval moet het eerste kitten binnen 1 uur geboren zijn. Zoniet dan dient u contact op te nemen met uw dierenarts. Indien de poes duidelijk zit te persen op een kitten en dit langer dan 15 minuten duurt, moet u ook zeker contact opnemen.

De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 kittens mag niet langer dan 30 minuten zijn. Anders dient gecontroleerd te worden waarom de bevalling niet vordert. Zo nodig zal een weeënversterkend middel worden ingespoten. Mocht de poes na de bevalling onrustig blijven, dan dient u te laten controleren of alle kittens inderdaad geboren zijn. Soms geeft de dierenarts de poes dan een injectie om eventueel achtergebleven nageboorten of kittens alsnog af te laten komen.

De poes mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 10e dag mag deze uitvloeiing helder slijmig zijn.



Verzorging kittens

U kunt de navelstrengetjes het beste door de poes laten afbijten. Mocht een navelstreng nabloeden dan kunt u deze afbinden met een stevige garendraad (eventueel ontsmet met spiritus of 85% alcohol). De kittens kunnen gemerkt worden met nagellak of een gekleurd halsbandje. De kittens moeten **dagelijks gewogen** worden, waarbij de gewichten van de kittens ook genoteerd worden. Een normaal geboortegewicht van een kitten is 85-120 gram. De kittens moeten **dagelijks 8-10% in gewicht aankomen**. De kittens mogen niet afvallen. Gebeurt dit wel dan is er iets mis. U dient in dit geval direct de dierenarts te bellen voor overleg. De poes kan te weinig melk geven of de kittens drinken te weinig, bijvoorbeeld door een opkomende ziekte. De kittens kunnen ook in een te koele omgeving liggen waardoor ze veel energie verspillen om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Een goede temperatuur voor de omgeving is gedurende de eerste 2 weken 30-35 graden, daarna 20-30 graden. De kittens doen na 10d de oogjes open en zijn dan in (geboorte)gewicht ongeveer verdubbeld.

Bijvoeren

Dit kan gebeuren met een zuigflesje of met een maagsonde. Als voeding moet een preparaat gebruikt worden dat de kattenmelk goed kan vervangen (bv. KMR, Nutriwelp). Voor de eerste levensweek heeft een kant en klaar produkt, zoals KMR, de voorkeur.

Het zal per preparaat wisselen wat de juiste hoeveelheid voeding is. Een **vuistregel** echter is:

- 0,5 ml – 1 ml elke 1-2 uur igv pasgeboren kitten
- 1 ml elke 2 uur na 24u
- vanaf de 2e week kunnen de kittens (bijna) de nacht door zonder voeding en volstaat een voeding van 2 ml melk per kitten, en zo 8 voedingen verspreid over de dag. Aan de hand van de groei van het kitten kunt u deze hoeveelheid wat bijsturen (een richtlijn is 8-10% toename in lichaamsgewicht per dag!). Groeit het kitten weer dan kunt u langzaam gaan afbouwen.

De **melk moet worden verwarmd** tot lauw-handwarm (ongeveer 37 graden). **Na elke voeding** is het belangrijk dat de **buik-anusstreek wordt gestimuleerd (wrijven met bv een natte vinger)** om het poep- en plasgedrag te stimuleren.



Sondevoeding

Dit is een snelle en eenvoudige manier om een kitten te voeden. Het is echter een methode die **enkel met goede instructies** veilig is toe te passen. Een alternatief is om het kitten met behulp van een spuitje te voeren of een klein flesje.

Benodigheden sondevoeding:

- 2 spuitjes 2ml (één vullen met beetje water, de ander met voeding)
- voedingssonde
- kunstmelk

De **lengte van de sonde** moet worden afgemeten op het kitten. Plaats daartoe (buiten het lichaamje) het uiteinde van de sonde op ongeveer $\frac{3}{4}$ van de ribben en meet de afstand tot de bek. Breng hier een **markering aan** (tape, merkstift). Naarmate de kittens groeien moet deze meting en markering worden herhaald. Houd met uw ene hand het hoofdje van het kitten goed stil. Met uw andere hand duwt u de sonde voorzichtig over het achterste van de tong heen en laat deze rustig in de keel naar beneden zakken. Het kitten zal met slikbeweginkjes de sonde inslikken. Als u **weerstand** voelt bij het opschuiven van de sonde moet u deze rustig een stukje terugtrekken en opnieuw starten (de sonde mag niet in de longen terecht komen!). De sonde moet zover worden ingebracht dat de markering bij het bekje uitkomt.

Laat eerst 0,4 ml water in de sonde lopen (Dit is een soort controle dat de sonde niet verkeerd zit). Vervolgens zet u de spuit met de voeding op de sonde en drukt u deze met een rustige vloeiende beweging leeg. Na enkele seconden kunt u de sonde met een rustige beweging uit het kitten halen. Na elke voeding van het nest moeten de sonde en de spuitjes worden **gereinigd**. Dit kan door ze met warm water uit te spoelen. Eventueel kan een rubber sonde (1x per dag) 10 minuten in kokend water worden gelegd.

Ontwormen en inenten

De kittens en de moederpoes moeten op de leeftijd van **3, 5 en 7 weken ontwormd** worden. Vervolgens moeten ze **maandelijks tot een ½ jaar leeftijd** worden ontwormd. De **eerste kittenenting** dient het kitten te krijgen als het **9 weken** oud is. Deze enting moet **3 weken later herhaald** worden. Naast ontworming en enting is ook een vlooiënbestrijding van belang.

Als het na het nestje niet wenselijk is dat de poes nogmaals een nestje krijgt dan is het advies om de **poes te laten steriliseren**. Dit kan vanaf 3 weken na de bevalling gebeuren. Zo'n sterilisatie op korte termijn heeft zeker de voorkeur boven (tijdelijk) de poezenpil!

Als een sterilisatie (nog) niet wenselijk is houdt u er dan rekening mee dat de poes al op korte tijd na de geboorte terug drachtig kan raken.

