

# Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samenstelling       | Bevat per ml 1,5 mg meloxicam en 5 mg natriumbenzoaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigenschappen       | Meloxicam is een niet-steroïdale ontstekingsremmer (NSAID) uit de oxicamgroep waarvan de werking berust op inhibitie van de prostaglandinesynthese, zodat een anti inflammatoir, analgetisch, anti exsudatief en antipyretisch effect bewerkstelligd wordt. Het vermindert de infiltratie van leukocyten in ontstoken weefsel. In mindere mate remt het tevens de collageengeïnduceerde trombocyten aggregatie. In vitro en in vivo studies hebben aangetoond dat meloxicam cyclo-oxygenase-2 (COX-2) sterker remt dan cyclo-oxygenase-1 (COX-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doeldier            | Hond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicaties          | Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat bij honden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toediening/dosering | Oraal toedienen gemengd met voer of direct in de bek. Goed schudden voor gebruik. De aanvangsbehandeling is een éénmalige dosis van 0,2 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht op de eerste dag (tweemaal de onderhoudsdosering). De dagelijkse behandeling dient, met een interval van 24 uur, te worden voortgezet met een orale onderhoudsdosis van 0,1 mg meloxicam per kg lichaamsgewicht, éénmaal per dag. De suspensie kan worden toegediend met het maatspuitje dat is meegeleverd in de verpakking. De spuit heeft een verdeling die overeenkomt met het vereiste volume. Klinisch effect wordt meestal binnen 3-4 dagen waargenomen. De behandeling dient te worden gestaakt wanneer er na uiterlijk 10 dagen geen klinische verbetering optreedt. Vermijd contaminatie tijdens gebruik.                                                                   |
| Contra-indicaties   | Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet gebruiken bij honden die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen zoals irritatie en bloedingen, verminderde lever-, hart- of nierfunctie en stollingsstoornissen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen. Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijwerkingen        | Typische bijwerkingen van NSAID's zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult faecal bloed, lethargie en nierfalen werden af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen is bloederige diarree, bloedbraken, gastro-intestinale ulceratie en verhoogde leverenzymen gemeld. Deze bijwerkingen komen gewoonlijk in de eerste behandelingsweek voor en zijn in de meeste gevallen van voorbijgaande aard en verdwijnen na het staken van de behandeling, maar kunnen in zeer zeldzame gevallen ernstig of fataal zijn. Indien er bijwerkingen voorkomen, dient de behandeling gestaakt te worden. In geval van overdosering dient een symptomatische behandeling te worden gestart.                                                                                                                                                                     |
| Waarschuwingen      | Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voorzorgen          | Andere NSAID's, diuretica, anticoagulantia, aminoglycoside-antibiotica en stoffen met een hoge plasma-eiwitbinding kunnen concurreren voor de eiwitbinding en dit kan derhalve leiden tot toxische effecten. Inflacam mag niet samen met andere NSAID's of glucocorticosteroiden worden toegediend. Bij behandeling met bovenstaande diergeneesmiddelen dient een behandelingsvrije periode van tenminste 24 uur voor aanvang van de behandeling met ontstekingsremmende stoffen in acht te worden genomen. Behandeling met bovenstaande diergeneesmiddelen voorafgaand aan de behandeling met ontstekingsremmende stoffen kan bijkomende of toegenomen bijwerkingen veroorzaken. Voor het bepalen van de behandelingsvrije periode dient rekening te worden gehouden met de farmacokinetische eigenschappen van de eerder gebruikte diergeneeskundige producten. |

# Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vervolg voorzorgen            | Vermijd het gebruik bij gedehydrateerde, hypovolemische of hypotensieve dieren; in deze gevallen is er een potentieel risico voor nefrotoxiciteit. Personen met een bekende overgevoeligheid NSAID's moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. In geval van accidentele inname, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd |
| Bewaarcondities/ Houdbaarheid | Bewaren in de originele verpakking. Houdbaar tot: 2 jaar na productiedatum.<br>Na de eerste opening van de flacon: 6 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verpakking                    | Flacon à 15 ml<br>Flacon à 42 ml<br>Flacon à 100 ml<br>Flacon à 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Registratienummer             | REG NL 110167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kanalisaie                    | UDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artikelnummer                 | 90.009.33 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 15 ml<br>90.009.34 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 42 ml<br>90.009.37 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 100 ml<br>90.009.38 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN code                      | 8714076006119 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 15 ml<br>8714076006126 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 42 ml<br>8714076006133 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 100 ml<br>8714076006140 Inflacam 1,5 mg/ml hond siroop 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |